

COLOREANDO

CONOZCO LA FAUNA DE MI REGIÓN



SEREMI
Región de Tarapacá


Ministerio del
Medio Ambiente




SEREMI
Región de Tarapacá

**Ministerio del
Medio Ambiente**


NAIRA VIVE EN UNA DE LA LOCALIDADES DEL ALTIPLANO CHILENO. Y NOS MOSTRARÁ ALGUNOS DE LOS ANIMALITOS QUE VIVEN CERCA DE SU HOGAR, EN EL SECTOR ALTOANDINO DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ.




EL **ZORRO CULPEO** (*Lycalopex culpaeaux*) HABITA LA ZONA CORDILLERANA DE TODO CHILE, DE ARICA A PUNTA ARENAS, SIENDO EL ZORRO MÁS GRANDE DE NUESTRO PAÍS. A LO LARGO DE LOS AÑOS HA SIDO PERSEGUIDO Y CAZADO PARA EL USO DE SU PIEL.




EL SURI O ÑANDÚ DEL NORTE (*Rhea pennata tarapacensis*) TIENE UN PLUMAJE QUE LE PERMITE MIMETIZARSE CON EL PAISAJE, YA QUE HABITA ÁREAS ALEDAÑAS A HUMEDALES DEL ALTIPLANO. POR SU FORMA Y TAMAÑO NO PUEDE VOLAR, PERO AL CORRER PUEDE ALCANZAR LOS 60 KM/H.




LA **VIZCACHA** (*Lagidium viscacia*) SE DISTRIBUYE ENTRE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA Y LA REGIÓN DE LOS LAGOS. HABITA LAS LADERAS ROCOSAS Y ESCARPADAS DE LOS CERROS ANDINOS, REFUGIÁNDOSE EN LAS CAVIDADES DE LAS ROCAS.




LA **PERDIZ DE LA PUNA** (*Tinamotis pentlandii*) VIVE EN PASTIZALES Y QUEBRADAS CON VEGETACIÓN, SOBRE LOS 3.500 METROS DE ALTITUD. SE DISTRIBUYE ENTRE LAS REGIONES DE TARAPACÁ Y ATACAMA, DESTACÁNDOSE POR SER UNA DE LAS PERDICES MÁS GRANDES DE CHILE.



EL **GATO ANDINO** (*Leopardus jacobita*) HABITA ZONAS ROCOSAS ALTOANDINAS DE ARGENTINA, BOLIVIA, PERÚ Y CHILE, SOBRE LOS 3.000 METROS DE ALTITUD. SE ALIMENTA PRINCIPALMENTE DE MAMÍFEROS PEQUEÑOS, AUNQUE TAMBIÉN PUEDE CAZAR REPTILES, AVES Y HUEVOS. DADA SU POBLACIÓN, ES MUY DIFÍCIL DE OBSERVAR.




LA **PARINA CHICA** O **FLAMENCO DE JAMES** (*Phoenicoparrus jamesi*), SE DISTRIBUYEN ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y LA REGIÓN DE COQUIMBO, EN PARTICULAR EN LAGUNAS Y BOFEDALES ALTOANDINOS.



LA **VICUÑA** (*Vicugna vicugna*), ES EL CAMÉLIDO MÁS PEQUEÑO DE SUDAMÉRICA Y HABITA LA ZONA DESÉRTICA DEL LOS ANDES DE PERÚ, BOLIVIA Y EL NORTE DE ARGENTINA Y CHILE, SOBRE LOS 3.500 METROS DE ALTITUD.




EL **PIUQUÉN** (*Chloephaga melanoptera*) SE DISTRIBUYE DESDE EL EXTREMO NORTE Y HASTA LA REGIÓN DEL MAULE, ENCONTRÁNDOSE PREFERENTEMENTE EN TERRENOS HÚMEDOS DE SECTORES ALTOANDINOS. ES COMÚN VERLOS EN PAREJAS O GRUPOS Y TIENDEN A SER MUY TERRITORIALES.








EL **PUMA** (*Puma concolor*) SE DISTRIBUYE POR LA ZONA CORDILLERANA DE TODO CHILE, DE ARICA A MAGALLANES; SIENDO ADEMÁS HABITANTE DE TODO EL CONTINENTE AMERICANO.
EN EL ALTIPLANO, SE ALIMENTA HABITUALMENTE DE VICUÑAS.




EL **CÓNDOR ANDINO** (*Vultur gryphus*), SE DISTRIBUYE EN TODO CHILE, POR LA ZONA CORDILLERANA DESDE ARICA A TIERRA DEL FUEGO. AL SER UN CARROÑERO, SE ALIMENTA ESENCIALMENTE DE CARNE EN DESCOMPOSICIÓN, AUNQUE A VECES TAMBIÉN COME HUEVOS Y RECIÉN NACIDOS DE OTRAS AVES.



EL QUIRQUINCHO DE LA PUNA (*Chaetophractus nationi*) SE DISTRIBUYE SOBRE LOS 3.000 METROS DE ALTITUD EN EL NORTE DE CHILE; ALCANZANDO PARTE DEL TERRITORIO DE ARGENTINA, PERÚ Y BOLIVIA. SE CARACTERIZAN POR POSEER UN CAPARAZÓN DORSAL APLANADA.




EL PATO JERGÓN CHICO (*Anas flavirostris oxyptera*) SE DISTRIBUYEN ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y ATACAMA, HABITANDO ZONAS RIBEREÑAS DE RÍOS, LAGUNAS, VEGAS Y BOFEDALES. SE ALIMENTA DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS PEQUEÑOS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS HUMEDALES.







EL **TUCO TUCO DE LA PUNA** (*Ctenomys opimus*) SE DISTRIBUYE EN EL ALTIPLANO DE BOLIVIA Y CHILE, INCLUIDA LA REGIÓN DE TARAPACÁ, SOBRE LOS 3.000 METROS DE ALTITUD. ES UN ROEDOR DE GRAN TAMAÑO Y SE ALIMENTA DE RAÍCES, TALLOS Y HOJAS QUE VA ENCONTRANDO A MEDIDA QUE CONSTRUYE TÚNELES Y GALERÍAS SUBTERRÁNEAS.



EL **CAITÍ** (*Recurvirostra andina*), SE DISTRIBUYE EN ZONAS HÚMEDAS ALTIPLÁNICAS ENTRE ARICA Y ATACAMA. SE CARACTERIZA POR TENER UN PICO FINO, LARGO Y CURVADO HACIA ARRIBA. SE ALIMENTA DE PEQUEÑOS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS DE LA ZONA FANGOSA DE LOS HUMEDALES.



EL *Telmatobius marmoratus* HABITA GRAN PARTE DEL ALTIPLANO Y ZONAS ADYACENTES DE BOLIVIA Y PERÚ, EN HUMEDALES SOBRE LOS 4.000 METROS DE ALTITUD. EXISTEN INVESTIGACIONES QUE SEÑALAN QUE SUS POBLACIONES ESTÁN DISMINUYENDO...



¡Y COMO ÉL EXISTEN MUCHOS OTROS ANFIBIOS EN NUESTRA REGIÓN!



