

Playero blanco (*Calidris alba*)



Largo: 17 - 20 cm. Frente, garganta, mejillas, cuello anterior, pecho y abdomen blancos. Alas con banda blanca, más notoria al estar extendidas. Pico negro. Patas negras.

Gaviota dominicana (*Larus dominicanus*)



Largo: 58 cm.
Envergadura: 135 cm.
Adulto con cabeza, parte ventral del cuerpo y cola totalmente blancos. Manto y alas negruzcas. Pico amarillo con mancha roja en la punta de la mandíbula inferior. Patas amarillas pálidas.

Gaviota de Franklin (*Larus pipixcan*)



Longitud: 40 cm. Es una gaviota pequeña. El pico es negruzco con punta rojiza oscura. Capucha incompleta de color gris oscuro. Cuerpo blanco con manto y alas de color gris pizarra.

Gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*)



Largo: 42 - 44 cm. Cabeza blanca en verano; y gris pardusco en invierno. Cuerpo gris, más oscuro en las partes superiores.

Gaviota peruana (*Larus belcheri*)



Largo: 47-50 cm. Es una gaviota más chica, larga y esbelta que la dominicana. Cabeza y cuello blanco. Dorso y cobertoras negro apizarrado. Pecho y abdomen blanco. Cola blanca con banda negra. Pico amarillo con punta rojiza y mancha negra. Patas amarillas.

Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*)



Largo: 42 cm. Pico largo y robusto, patas costas en relación al cuerpo. Cabeza aparentemente grande. Corona y nuca negras formando una boina. Abdomen y subcaudales blancos. Partes superiores gris pálido. Cola blanca muy ahorquillada y larga.

Gaviotín elegante (*Sterna elegans*)



Largo: 41 cm.
Gaviotín grande y esbelto, de pico largo y punta caída. El manto es gris perla, patas anaranjadas o negruzcas. Partes inferiores y cola blancas. Pico anaranjado y/o amarillento con una leve curvatura. Zona negra en la cabeza por detrás del ojo y parte anterior blanca.

Gaviotín monja (*Larosterna inca*)



Largo: 41 cm.
Gaviotín compacto, con aspecto de gaviota y alas anchas. Color gris apizarrado oscuro, algo más claro en la garganta y subalares. Alas grises. Cola negra pardusca. Pico rojo con comisura amarilla, sobre ésta y bajo el ojo largas plumas blancas hacia atrás y encorvadas hacia abajo. Patas rojas.

Rayador (*Rynchops niger*)



Largo: 40-50 cm. Negro por encima y blanco por debajo. Corona y nuca negras en contraste con la frente y la cara blancas. Cola oscura. Pico rojo en su base y negro en la punta. Patas rojas, cortas y pequeñas.

Pequén (*Athene cunicularia*)



Largo: 26 cms. Buho que posa erguido, con patas largas y ojos relativamente chicos. Cabeza y partes superiores de color café terroso con manchas blanquecinas, más gruesas en el cuerpo. Líneas superciliares blanquecinas.

Churrete costero (*Cinclodes nigrofumosus*)



Largo: 27 cms. Partes superiores pardo negruzco ahumado. Línea superciliar finamente acanelada. Garganta y lados del cuello color blanquecinos. Pecho y abdomen pardo ahumado, con rayitas longitudinales acanelado claro que disminuyen hacia las partes inferiores. Alas con bandas canela claro que las atraviesa por la mitad. Cola, patas y pico negro.

Gaviotín chico (*Sternula lorata*)




Largo: 15 cm.
Parte superior de la cabeza y nuca negras, frente blanca. Garganta, mentón y zona auricular baja blancas. Dorso, lomo plumas cobertoras, supracaudales y cola gris apizarrado. Pecho, flancos y abdomen gris pálido. Pico amarillento, con su punta negra. Patas amarillentas. Ojos pardos.



Soy **Inti**, un gaviotín chico o chirrío (*Sternula lorata*, antes *Sterna lorata*) y formo parte de la avifauna que vive vinculada a la corriente de Humboldt, ocupando zonas con clima desértico costero en la zona oeste de Sudamérica. Soy una especie migratoria y me reproduzco en las costas de Perú y norte de Chile, en tanto suelo visitar el centro sur de Ecuador durante la estación de reposo reproductivo. Me han observado desplazándome desde la costa norte de Chile durante los inviernos hacia el Norte, alcanzando hasta las costas del Golfo de Guayaquil (Chapman, 1926; Del Hoyo et. Al., 1996).

Actualmente mi población se encuentra en descenso, estimándose una disminución poblacional del 50% en los últimos 10 años. Esta situación ha llevado a que las autoridades nacionales nos consideren como especie en peligro, mientras que, en Perú, como especie vulnerable. Diversos informes y estudios poblacionales evidencian la pérdida de hábitat reproductivo y disminución de la oferta alimenticia que venimos sufriendo como especie y que repercute en nuestra conservación, factor considerado como una de las principales amenazas que nos afecta.

GUÍA DE AVISTAMIENTO DE AVES COSTERAS Región de Tarapacá




Proyecto de Educación y Sensibilización para la puesta en valor del Gaviotín Chico en la Región de Tarapacá



Pingüino de Humboldt

(*Spheniscus humboldti*)



Largo: 65 cm.
Coloración: negro en las partes superiores y blanco en las inferiores. Se caracteriza por poseer una banda negra en el pecho, que es diagnóstica cuando están en tierra.

Guanay

(*Phalacrocorax bougainvillii*)



Largo: 68 cms.
Cabeza, cuello y dorso de color negro con brillo verdoso (arriba) a azulado (abajo). Flancos y parte externa de los calzones negros. Garganta, base del cuello, pecho y abdomen blancos. Zona desnuda roja alrededor del ojo.

Traro

(*Caracara plancus*)



Largo: 55 - 58 cm.
Envergadura: 120 cm.
Corona negra con plumas traseras levantadas similar a un moño. Mejillas, garganta y cuello cremosos. Base del cuello, pecho y manto pardo oscuro con estrías transversales cremosas. Lomo y pantalones pardo oscuro. Alas y cola blanquecinas con muchas barras transversales pardas. Ala con punta negra. Gran pico amarillento con base azulada y cera anaranjada.

Pitotoy chico

(*Tringa flavipes*)



Largo: 23 - 25 cm.
Por encima pardo grisáceo y alas parduzcas con finas barras blancas. Garganta blanquecina y pecho blanquecino con finas rayas parduzcas. Abdomen blanco. Pico negro. Patas amarillas.

Piquero

(*Sula variegata*)



Largo: 74 cm.
Coloración: Pico largo gris azulado. Cabeza, cuello y partes inferiores de color blanco. Partes superiores café con plumas bordeadas de blanco, dando el aspecto de escamas. Patas grises. La cola es oscura terminada en punta con su base clara. Zona desnuda de la cara de color negro. Ojos rojizos.
Envergadura: 150 cm.

Garza grande

(*Ardea alba*)



Largo: 85 cms.
Totalmente blanca. Pico puntiagudo amarillo. Iris amarillo. Piernas largas negras y patas negras.

Águila pescadora

(*Pandion haliaetus*)



Largo: 58 cm.
Envergadura: 150 - 180 cm.
Peso: 1500 - 2000 gr.
Cabeza, cuello, pecho y abdomen blancos. Línea gruesa negra, semejante a un antifaz, entre el ojo y la nuca. Dorso café oscuro, con marginaciones blancas.

Pitotoy grande


(*Tringa melanoleuca*)



Largo: 29 - 33 cm.
Cabeza, cuello y espalda manchados de blanco y pardo. Mejillas, garganta, pecho y abdomen blancos. Alas pardo oscuro moteado de blanco. Pico recto, negro y largo. Patas largas amarillas.

Pelícano


(*Pelecanus thagus*)



Largo: 150 cm.
Coloración: Cabeza blanca. El cuello es completamente blanco en invierno, mientras que en el período reproductivo posee una banda café oscura en la parte posterior del cuello. Partes superiores del cuerpo gris moteado de blanco.
Envergadura: 225 cm.

Garza chica

(*Egretta thula*)



Largo: 50 cm.
Totalmente blanca. Pico negro con base amarilla. Cuello largo. Piernas largas negras por delante y amarillas por detrás. Patas amarillas. Ojos amarillos. Plumas largas en la cabeza, dorso y pecho, más visibles en la época de reproducción.

Chorlo nevado

(*Charadrius nivosus*)



Largo: 15 - 17 cm.
Frente blanca. Corona anterior negra. Corona posterior, nuca, cobertoras y dorso grisáceo con tinte arenoso. Línea blanca que rodea el cuello. Mancha negra en la zona auricular. Línea gruesa negra dividida en el centro del cuello, que separa la garganta del pecho. Primarias negro parduzco.

Zarapito


(*Numenius phaeopus*)



Largo: 42 cm. Corona parda con línea blanquecina en el centro. Cejas blanquecinas. Cara y cuello moteado fino de pardo y blanquecino. Dorso y cobertoras moteados de pardo y blanquecino. Pecho café claro moteado de oscuro. Alas pardas con algunas manchas claras grandes. Cola con líneas transversales pardas claras y oscuras. Patas grises. Pico largo y curvado hacia abajo.

Lile

(*Phalacrocorax gaimardi*)



Largo: 75 cm. **Coloración:** gris con una notoria mancha blanca a cada lado del cuello. Pico amarillo con base roja. Patas rojas.

Huairavo

(*Nycticorax nycticorax*)



Largo: 56 - 65 cm. **Envergadura:** 105 - 112 cms. Cabeza negruzca con azul tornasolado. Frente y superciliares blancas. Dos o tres plumas largas blancas que salen desde la cabeza hacia atrás. Dorso y lomo negruzcos con brillos tornasolados azules y verdes. Garganta blanca. Pecho y abdomen grisáceo claro y alas grises más oscuras. Pico grueso oscuro. Patas amarillas. Ojos rojos.

Pilpilén

(*Haematopus palliatus*)



Largo: 43 - 44 cm.
Cabeza, cuello y pecho superior negro apizarrado. Dorso, lomo gris pardusco oscuro. Pecho inferior, abdomen y mayor parte interior del ala blanco puro. Cola parda grisácea. Pico recto rojo con punta amarillenta. Patas blanquecinas a rosadas. Ojos amarillos con anillo rojo.

Playero vuelvepedras

(*Arenaria interpres*)



Largo: 16 - 24 cm. Playero compacto con patas cortas y pico puntiagudo. Cabeza parda con manchas blancas. Garganta blanca. Semicollar pardo oscuro en el pecho. Pecho inferior, abdomen y flancos blancos. Dorso y cobertoras pardo moteado con pardo oscuro y machitas blancas. Cola parda oscura con punta blanca. Patas amarillas a anaranjadas. Pico negruzco.

Yeco

(*Phalacrocorax brasilianus*)



Largo: 60 cm. Cormorán de tamaño medio completamente negro con una pequeña línea blanca en la comisura del pico.

Jote de cabeza colorada

(*Cathartes aura*)



Largo: 62 - 81 cm.
Envergadura: 160 - 182 cm
Cuerpo de color negro pardusco. Cabeza y cuello desnudos, rojos. Cola y alas por debajo gris blanquecino. Pico blanco corneo. Patas grises. Ojos rojos.

Pilpilén negro

(*Haematopus ater*)



Largo: 45 cm.
Negro apizarrado. Dorso y cobertoras contornos pardos oscuros. Pico largo, recto y macizo, de color rojo con punta amarillenta. Patas rosado suave. Ojos amarillos, anillo periocular rojo.

Playero de las rompientes

(*Aphriza virgata*)



Largo: 24 - 26 cm.
Playero compacto con patas cortas y gruesas. Partes superiores, cobertoras y pecho de tono gris bastante uniforme. Garganta blanquecina. Pecho inferior y abdomen blanco. Flancos blancos con manchas oscuras. Cola con rectrices negras y punta blanca. Pico negro con base anaranjada. Patas verde amarillento.